Gyermekem átesett a fertőzésen, szükséges-e az oltás?

A fertőzés kivált ugyan védelmet, azonban ennek mértéke személyenként nagyon eltérő és megjósolhatatlan. Enyhe lefolyás esetén az immunválasz meglehetősen gyenge. Ezzel szemben az oltás bizonyítottan erőteljesebb és hosszabb időtartamú választ eredményez, jobban véd a vírus-mutánsok ellen is. A fertőzésen már átesett gyermekeknél az oltás egyúttal extrém hatékony emlékeztetőként is működik.

Gyermekeknél a fertőzés általában enyhe lefolyású, miért kéne oltatni?

Gyermekeknél is előfordul a fertőzés súlyos, akár halálos formája. Enyhe lefolyás esetén is ugyanúgy kialakulhatnak hosszabb távú súlyos következmények. Továbbá az esetleges új mutánsok gyermekekre gyakorolt hatása sem ismert. „Sosem tudhatom, hogy az én gyermekem éppen hogy fog reagálni!” - nem érdemes kockáztatni.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete szakmai ajánlása figyelembevételével készült tájékoztató

ÉLJEN A 2021. NOVEMBER 22-DECEMBER 05.. OLTÁSI AKCIÓHÉT LEHETŐSÉGGEL, AMIKOR GYERMEKE MINDEN NAP A SZEKSZÁRDI KÓRHÁZBAN
(07.00-13.30 „LILA ÉPÜLET” BÉRI B. Á. U. FELŐLI BEJÁRAT, 13.30-19.00 RENDELŐINTÉZET),
A DOMBÓVÁRI ÉS A BONYHÁDI KÓRHÁZBAN
07.00-19.00 ÓRA KÖZÖTT,
AKÁR ELŐZETES BEJELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ ÉS IDŐPONTFOGLALÁS NÉLKÜL IS
KÖNNYEN, GYORSAN, JÓ SZAKMAI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
FELVEHETI AZ OLTÁST ÖN, VAGY GYERMEKE.

(Kiskorú oltása esetén: Szülői beleegyező nyilatkozat, továbbá 12-16 éves kor között szülői/ törvényes képviselői kíséret szükséges.)

FELHÍVÁS

A 4. JÁRVÁNYHULLÁMBAN A NEM OLTOTTAK, ILLETVE AZOK, AKIK OLTÁSA 4-6 HÓNAPNÁL RÉGEBBEN TÖRTÉNT, KÜLÖNÖSEN VESZÉLYEZTETETTEK:
JÓVAL NAGYOBB AZ ESÉLYÜK A MEGFERTŐZŐDÉSRE, A BETEGSÉG SÚLYOS, AKÁR HALÁLOS LEFOLYÁSÁRA. A 3. OLTÁS A MÁSODIKHOZ KÉPEST ÁTLAGOSAN MINTEGY TÍZSZERESÉRE NÖVELI AZ ANTITESTES IMMUNVÁLASZT!

A 12-18 ÉVES GYERMEKEK ÁTOLTOTTSÁGA MESSZE ELMARAD – 30% KÖRÜLI – AZ ORSZÁGOS 60 % FÖLÖTTI ÁTOLTOTTSÁGTÓL.
A NEM OLTOTT GYERMEKEK IS SÚLYOSAN MEGBETEGEDHETNEK!
ENYHE LEFOLYÁS ESETÉN IS HOSSZÚ TÁVÚ SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEK ALAKULHATNAK KI!

GYERMEKEINK KÖZÖSSÉGBE JÁRNAK, A FERTŐZÉSNEK ŐK A LEGINKÁBB KITETTEK ÉS ŐK TERJESZTIK LEGINKÁBB A BETEGSÉGET!

A GYERMEKEK OLTÁSÁNAK ESETLEGES KOCKÁZATAI MESSZE ELMARADNAK A BETEGSÉG VESZÉLYEITŐL!

„AKI MEGMENT EGY ÉLETET,
EGY EGÉSZ VILÁGOT MENT MEG.”

TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

COVID-ELLENI OLTÁSI AKCIÓHÉT

2021. NOVEMBER 22. HÉTFŐTŐL 2021. DECEMBER 05. VASÁRNAPIG
MINDEN NAP
07.00 – 19.00 ÓRA KÖZÖTT

OLTÁSI HELYSZÍNEK

TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ
DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ
BONYHÁDI KÓRHÁZ

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ ÉS IDŐPONTFOGLALÁS NÉLKÜL IS,
KÖNNYEN, GYORSAN,
SZAKMAILAG MEGFELELŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, FELVEHETI
AZ 1., AZ ELMARADT 2., ÉS A 3. OLTÁST.
TOVÁBBÁ GYERMEKÉT IS BEOLTATHATJA!

(Kiskorú oltása esetén: Szülői beleegyező nyilatkozat, továbbá 12-16 éves kor között szülői/ törvényes képviselői kíséret szükséges.)

„AKI MEGMENT EGY ÉLETET,
EGY EGÉSZ VILÁGOT MENT MEG.”

OLTASSAM VAGY NE OLTASSAM COVID-ELLEN GYERMEKEM?

FÉLTVE ŐRZÖTT KINCSEM

A védőoltás csökkenti a koronavírus megbetegedés halálos kimenetelének az esélyét!

Rendszeresen találkozunk gyermekáldozatokról szóló tudósításokkal; pl. az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia és a Gyermekkórház Szövetség adatai szerint **a halálozás a gyermekeknél 0.00%-0.26%-**os (az USA 45 államában történt felmérés alapján; 7 államban egyáltalán nem fordult elő).

A védőoltás csökkenti a súlyos lefolyás, kórházba kerülés, intenzív kezelés, oxigénterápia esélyét!

Ugyancsak amerikai egyesült államokbeli adatok szerint a 12-17 éves korosztályból **tízszeres eséllyel kerülnek kórházba** a teljes oltási sorozattal nem rendelkezők.

A védőoltás segít a sokszervi gyulladásos megbetegedés megelőzésében!

Akár enyhe lefolyású koronavírus-fertőzést követően is gyermekekben későbbi szövődményként **súlyos sokszervi gyulladás** alakulhat ki a szervezet kóros immunválasza miatt.

A védőoltás segít a hosszútávú-COVID (long-COVID, post-COVID) megelőzésében!

A fertőzés lezajlása után 6-8 hétig vagy akár hónapokig is **nagyfokú állandó fáradtság, memóriazavar, számolási-, nyelvhasználati-, gondolkodási-, tanulási nehézség, a koncentrálóképesség csökkenése, krónikus tüdő problémák, elhúzódó ízérzés- és szaglásvesztés** állhat fenn a gyermekeknél. Ez egészséges fiataloknál is előfordulhat, akik tünetmentesen, vagy akár egészen enyhe tünetekkel estek át a fertőzésen.

BARÁTAI, TÁRSAI, SZÜLEI, NAGYSZÜLEI

A védőoltás csökkenti a fertőzés átadásának kockázatát!

Az oltott gyermekek kevésbé adják át a vírust barátaiknak, társaiknak, szeretteiknek, szüleiknek, nagyszüleiknek, tanáraiknak. Ezzel őket is védik! Különösen fontos ez a fiataloknál, akik iskolába járnak, sportolnak, programokra mennek, szórakoznak.

CSAK NE ÁRTSAK AZ OLTÁSSAL NEKI!

Milyen mellékhatások lehetnek?

A tizenévesekben megfigyelt mellékhatások azonosak a felnőtteknél tapasztaltakkal: **fájdalom, bőrpír, duzzanat az injekció beadásának helyén, fáradtság, fejfájás, ízületi- és izomfájdalom, rossz közérzet, szédülés, esetleg láz, hasmenés –** ezek a 2. oltás után erőteljesebben jelentkezhetnek, pár nap alatt elmúlnak. **A felnőtteknél ismert anafilaxiás reakció extrém ritka.** A védőoltás beadása után edzeni, sportolni lehet, de a kifejezetten erőteljes edzések néhány napig kerülendők.

Mekkora a szívizomgyulladás tényleges kockázata az oltás után?

Elsősorban a tizenéves fiúk oltásánál létezik ez a kockázat, jellemzően pár nappal az oltás és inkább a második adag beadása után jelentkezhet; mellkasi fájdalom, légszomj, szívdobogás érzés, gyengeség kíséri; általában pár nap alatt megszűnik, tüneti terápiával, pihenéssel jól kezelhető. **A szívizomgyulladás azonban maga a fertőzés hatására hatszor gyakrabban fordul elő, mint az oltás következtében.**

Érinti az oltás a növekedést vagy a serdülést?

Nincs biológiai ok vagy bizonyíték, ami arra utalna, hogy az oltás beavatkozna ezekbe a folyamatokba, vagy hatással lenne a hormonháztartásra. A vakcina nem tartalmaz örökítő anyagot (DNS), nem lép be a sejtek magjába, így nem jut a DNS közelébe, hogy azt megváltoztassa, nem okoz génmódosulást. Az mRNS megtanítja a szervezetet az ellenanyag-termelésre és memória-sejtek keletkeznek, maga viszont hamar lebomlik. A hosszú távú mellékhatások valószínűtlenek.

Nem okozhat meddőséget vagy magzati károsodást a vakcina?

Nincs bizonyíték arra, hogy hatása lenne a vakcinának a reproduktív folyamatokra, a teherbeesésre, a várandósság lefolyására vagy a magzat fejlődésére. Előfordulhat a menstruációs ciklus szabálytalansága, mely nem tart tovább egy-két hónapnál.

Nem okoz hosszú távon rákos megbetegedést az oltás?

A rákos megbetegedések kialakulásáért **a genetikai tényezők, környezeti faktorok (pl. táplálkozás, légszennyezettség), életmód (pl. dohányzás, alkohol-fogyasztás), egyes vírusok a felelősek. Nincs semmi bizonyíték a védőoltások és a rákbetegedések összefüggésére.** Az oltással bevitt mRNS hamar lebomlik, sokkal rövidebb ideig van a szervezetünkben, mint a rákkeltő anyagok.

Gyermekem krónikus beteg, kaphat-e oltást?

A krónikus betegségek — pl. lisztérzékenység, cukorbetegség, autoimmun betegség, daganatos betegség, pajzsmirigybetegség — **nem jelentenek oltási akadályt.** Ellenjavallat csak a vakcina valamely anyagával szembeni túlérzékenység.

Megfertőződhet-e gyermekem az oltástól vagy fertőzővé válhat-e?

Az mRNS-oltás **nem tartalmaz sem elölt, sem legyengített vírust, sem egyéb vírusrészt**, hatására a szervezet időlegesen csak a vírus tüskefehérjéje előállítására képes; ezért maga az oltás vírusfertőzést nem okoz, az oltott nem fertőz, az oltás biztonságossága nagy.